



Manejo de pacientes con **ENFERMEDAD DEL TRACTO URINARIO INFERIOR FELINO**

EVALUACIÓN INICIAL DEL PACIENTE PARA DETERMINAR LA CAUSA SUBYACENTE. EN FUNCIÓN DE LA PUNTUACIÓN DE LA CONDICIÓN CORPORAL (PCC, ESCALA 1-5), ALIMENTAR CON:



PCC 1 - 3



PCC ~ 3,5 TENDENCIA
A LA OBESIDAD



PCC 4 - 5



TRAS EL DIAGNÓSTICO¹ Y PARA REDUCIR LA RECURRENCIA

CIF

UROLITOS DE ESTRUVITA
O TAPONES URETRALES

UROLITOS DE
OXALATO CÁLCICO

UROLITOS DE URATO
AMÓNICO



UROLITOS MÚLTIPLES
O GRANDES



EXTRACCIÓN QUIRÚRGICA



EN FUNCIÓN DE LA PCC Y DEL ENTORNO DEL GATO, ALIMENTAR CON:



	PCC 1 - 3	PCC ~ 3,5 Tendencia a la obesidad	PCC 4 - 5
SI SE DETECTA ESTRÉS:			
ALTERNATIVA SI PUEDE EXCLUIRSE EL ESTRÉS:			



1. Para información sobre los tipos de cálculos menos frecuentes, consulta la Guía de Cristaluria de Hill's o a nuestros veterinarios en el teléfono 91 3717115. Hill's ofrece además a todos sus clientes veterinarios un servicio gratuito de análisis e interpretación de urolitos en el Minnesota Urolith Center (EE.UU.).

*Servicio gratuito de análisis de urolitos en el Minnesota Urolith Center (EE.UU.) para todos los veterinarios clientes de Hill's.

Para más información, consulta la página de la guía correspondiente a cada producto.

Teléfono de Asistencia Técnica de Hill's: 91 3717115